Redemplo®
Plozasiran Injektion

Anwendung von Redemplo® (Plozasiran)

Eine Dosis alle 3 Monate[1]

Dieser Leitfaden soll medizinisches Fachpersonal bei der Vorbereitung und Verabreichung von Redemplo unterstützen

Anwendungsgebiete
Redemplo wird angewendet als Ergänzung zu Ernährungsmaßnahmen zur Senkung des Triglyceridspiegels bei erwachsenen Patienten mit Familiärem Chylomikronämie-Syndrom (FCS)[1]

Die empfohlene Plozasiran-Dosis beträgt 25 mg als einmalige subkutane Injektion alle 3 Monate. Die Behandlung sollte von einem in der Behandlung von Patienten mit FCS erfahrenen Arzt eingeleitet und überwacht werden. Die erste Injektion durch den Patienten selbst oder eine Pflegeperson ist unter Anleitung einer entsprechend qualifizierten medizinischen Fachperson zu erfolgen.[1]

Dieses Dokument enthält Anleitungen zu folgenden Themen:



Vorbereitung und Handhabung der Fertigspritze



Auswahl geeigneter Injektionsstellen



Korrekte Injektionstechnik



Sichere Entsorgung von gebrauchtem Material

Dies ist Teil der umfassenderen Redemplo-Materialien für medizinisches Fachpersonal. Weitere Ressourcen zur Unterstützung des Therapiebeginns finden Sie unter www.redemplo.de.

Checkliste für Ihre Einrichtung vor der Anwendung von Redemplo

Beachten Sie vor der Anwendung von Redemplo die folgenden Punkte für Ihre Einrichtung



Prüfung

Stellen Sie sicher, dass das Arzneimittel bei Temperaturen von 2 °C bis 8 °C gelagert wird. Das Arzneimittel kann einmalig für einen Zeitraum von bis zu 30 Tagen bei Raumtemperatur (15 °C – 25 °C) gelagert werden.



Mitarbeiterschulung

Planen Sie Schulungen, um sicherzustellen, dass die zuständigen medizinischen Fachkräfte mit dem Protokoll zur dreimonatlichen Verabreichung vertraut sind.



Patientenvorbereitung

Stellen Sie sicher, dass die geeigneten Patienten für den Beginn einer Redemplo-Therapie identifiziert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Redemplo Fachinformation. Sie können auch die für Fachkreise verfügbaren Ressourcen auf der Redemplo-Webseite nutzen.

Vorbereitung zur Injektion von Redemplo


Alle für die Injektion benötigten Utensilien bereitlegen

Legen Sie die folgenden Utensilien auf eine saubere, gut beleuchtete und ebene Arbeitsfläche:[2]

- 1 Redemplo Fertigspritze in der Faltschachtel
- Alkoholtupfer (nicht enthalten)
- Wattebausch oder Mullkompresse (zusätzlich erforderlich)
- Pflaster (zusätzlich erforderlich)
- Kanülenabwurfbehälter (zusätzlich erforderlich)


Das Arzneimittel soll im Kühlschrank gelagert werden (2 °C – 8 °C) und darf nicht eingefroren werden. Es kann einmalig für einen Zeitraum von bis zu 30 Tagen bei Raumtemperatur (15 °C – 25 °C) gelagert werden. Das Arzneimittel ist zu entsorgen, wenn es nicht innerhalb von 30 Tagen bei Aufbewahrung bei Raumtemperatur oder bis zum auf dem Umkarton aufgedruckten Verfallsdatum verwendet wird (je nachdem, welches Datum früher eintritt).[1]

Aufbau der Redemplo Fertigspritze



Öffnen Sie den Deckel der Faltschachtel, nehmen Sie die Spritze am Spritzenzylinder heraus und legen Sie sie auf eine ebene Fläche[2]

- Verwenden Sie die Fertigspritze nicht, wenn das Sicherheitssiegel an der Faltschachtel beschädigt ist.[2]
- Fassen Sie die Fertigspritze nicht am Kolben oder an der Nadelschutzkappe an und ziehen Sie auch nicht am Kolben bzw. an der Nadelschutzkappe.[2]



Zum Entfernen am Spritzenzylinder anfassen


Überprüfen Sie das Verfalldatum („EXP") auf der Redemplo Fertigspritze

- Nicht verwenden, wenn das Verfallsdatum („verw.bis") oder das Entsorgungsdatum auf der Faltschachtel überschritten ist.[2]

Die Fertigspritze sollte vor der Injektion Raumtemperatur (15 °C – 25 °C) annehmen. Sie sollte mindestens 30 Minuten vor der Anwendung aus dem Kühlschrank (2 °C – 8 °C) genommen werden. Es sollten keine anderen Erwärmungsmethoden (z. B. heißes Wasser oder Mikrowelle) verwendet werden.[1]

Arzneimittel und Spritze überprüfen

- Das Arzneimittel sollte vor der Anwendung einer Sichtprüfung unterzogen werden. Die Lösung sollte klar und farblos bis gelb sein.[1]
- Wenn die Lösung trüb ist oder sichtbare Partikel enthält, darf der Inhalt nicht injiziert werden und das Arzneimittel muss an die Apotheke zurückgegeben werden.[1]



Überprüfen Sie die Fertigspritze


- Verwenden Sie die Fertigspritze nicht, wenn sie an irgendeiner Stelle Risse aufweist oder defekt ist.[2]
- Verwenden Sie die Fertigspritze nicht, wenn die Nadelschutzkappe fehlt oder nicht sicher befestigt ist.[2]
- Verwenden Sie die Fertigspritze nicht, wenn sie auf eine harte Oberfläche gefallen ist, da sie beschädigt sein könnte.[2]

Bringen Sie die Fertigspritze in allen oben genannten Fällen in die Apotheke zurück.[2]

Injektion von Redemplo


1. Injektionsstelle auswählen


Als Injektionsstellen geeignet sind der Oberarm (bei Verabreichung durch eine Pflegeperson), Oberschenkel und Bauch (außer in einem Radius von 5 cm um den Nabel). Dieses Arzneimittel darf nicht in Bereiche injiziert werden, in denen die Haut empfindlich, gerötet, verhärtet oder verletzt ist oder Blutergüsse, Narben oder Dehnungsstreifen aufweist. Dieses Arzneimittel darf nicht in denselben Bereich injiziert werden, in den andere Arzneimittel injiziert werden.[1]



2. Injektionsstelle reinigen

- Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife.[2]
- Reinigen Sie die Injektionsstelle mit einem Alkoholtupfer und lassen Sie Ihre Haut vor der Injektion trocknen. Berühren Sie diese Hautstelle vor der Injektion nicht erneut.[2]






3. Nadelschutzkappe abnehmen

Halten Sie die Spritze am Spritzenzylinder so, dass die Nadel von Ihnen weg zeigt.[2]


Ziehen Sie die Nadelschutzkappe gerade und von Ihrem Körper weg ab. Die Nadelschutzkappe nicht drehen oder biegen.[2]

Achten Sie darauf, den Kolben nicht nach vorne zu schieben, bevor Sie nicht für die Injektion bereit sind. Achten Sie darauf, dass die Nadel keine Oberfläche berührt. Setzen Sie die Nadelschutzkappe nicht wieder auf die Spritze auf.[2]




4. Haut zusammenkneifen und Nadel einführen

- Halten Sie die Spritze mit einer Hand.[2]
- Kneifen Sie die Haut an der Injektionsstelle vorsichtig zu einer Falte zusammen.[2]
- Führen Sie die Nadel in einem Winkel von 45° bis 90° ein.[2]
- Kneifen Sie die Hautfalte beim Einführen der Nadel und während der Injektion weiter zusammen. Legen Sie Ihren Finger vor der Injektion nicht auf den Kolben.[2]




5. Hautfalte beibehalten und Kolben nach vorne schieben

- Schieben Sie den Kolben unter langsamem und gleichmäßigem Druck bis ganz nach vorne, während Sie die Hautfalte weiter zusammenkneifen.[2]
- Nachdem Sie den Kolben bis ganz nach vorne geschoben haben, lassen Sie ihn in dieser Position und warten Sie 5 Sekunden, während die Nadel vollständig in die Haut eingeführt ist, um sicherzustellen, dass die volle Dosis abgegeben wird.[2]



6. Injektion abschließen

- Ziehen Sie die Spritze vorsichtig aus der Haut. Ziehen Sie den Kolben nicht mit der Hand zurück. Heben Sie die gesamte Spritze gerade nach oben. Reiben Sie nicht an der Injektionsstelle.[2]



Entsorgung von Redemplo



Jede Fertigspritze darf nur einmal verwendet werden und muss anschließend gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften in einem Kanülenabwurfbehälter entsorgt werden.[1]

Setzen Sie die Nadelschutzkappe nicht wieder auf die Spritze auf.[2]

Um Patienten oder Pflegepersonen in der richtigen Verabreichungstechnik für die spätere Selbstanwendung zu schulen, nutzen Sie die Gebrauchsinformation und das Video zur Verabreichung durch den Patienten: www.MeinArrowheadPortal.de

Die vollständigen Verschreibungsinformationen, einschließlich Kontraindikationen, Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen, finden Sie hier in der Fachinformation.

Die in diesem Material gewählte männliche Form (z. B. Arzt, Patient) bezieht sich immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse Personen.
Auf eine Mehrfachbezeichnung wird in der Regel zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

Referenzen: **1.** Redemplo Fachinformation, Stand: Juni 2026. **2.** Redemplo Gebrauchsinformation, Stand: Juni 2026.

FCS, Familiäres Chylomikronämie-Syndrom.

Notizen:

▼Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: http://www.bfarm.de zu melden. Verdachtsfälle von Nebenwirkungen oder Qualitätsbeschwerden können auch an Arrowhead Pharmaceuticals Ireland Limited gemeldet werden: E-mail: Nebenwirkungen: safety@arrowheadpharma.com, Qualitätsbeschwerden: productcomplaints@arrowheadpharma.com.

Redemplo 25 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze

Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Wirkstoff: Plozasiran. Jede Einzeldosis-Fertigspritze enthält Plozasiran-Natrium entsprechend 25 mg Plozasiran in 0,5 mL Lösung. Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** Redemplo wird angewendet als Ergänzung zu Ernährungsmaßnahmen zur Senkung des Triglyceridspiegels bei erwachsenen Patienten mit familiärem Chylomikronämie-Syndrom (FCS). **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Sehr häufig: Hyperglykämie. Häufig: Kopfschmerzen, Übelkeit, Reaktion an der Injektionsstelle. Gelegentlich: Lebererkrankung (ALT, AST erhöht). **Pharmazeutischer Unternehmer:** Arrowhead Pharmaceuticals Ireland Limited, One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, D01 X9R7, Irland. **Stand der Information:** 06/2026. **Verschreibungspflichtig.**

arrowhead pharmaceuticals

Redemplo® ▼
Plozasiran Injektion

© 2026 Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
MAT-0973-v1.0-07/2026